

# 13

Fecha de presentación: enero, 2022

Fecha de aceptación: marzo, 2022

Fecha de publicación: abril, 2022

## PERCEPCIÓN

DEL USO DE PRESERVATIVOS Y SU RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

### **PERCEPTION OF CONDOM USE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE PROTECTION OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO**

Lizette Martin Estévez<sup>1</sup>

E-mail: [lmartin@utb.edu.ec](mailto:lmartin@utb.edu.ec)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9087-2010>

Blanca Cecilia Álvarez Macías<sup>1</sup>

E-mail: [balvarezm@utb.edu.ec](mailto:balvarezm@utb.edu.ec)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5661-3661>

Fanny Suárez Camacho<sup>1</sup>

E-mail: [fsuarezm@utb.edu.ec](mailto:fsuarezm@utb.edu.ec)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8944-270X>

Alicia Filadelfia Escobar Torres<sup>1</sup>

E-mail: [alicia69escobar@gmail.com](mailto:alicia69escobar@gmail.com)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2027-1954>

<sup>1</sup> Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador.

#### Cita sugerida (APA, séptima edición)

Martin Estévez, L., Álvarez Macías, B. C., Suárez Camacho, F., & Escobar Torres, A. F. (2022). Percepción del uso de preservativos y su relación con la protección de las enfermedades de transmisión sexual en los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(S2), 123-127.

#### RESUMEN

En el artículo se determinó el nivel de percepción del uso de preservativos y su relación con la protección contra las enfermedades de transmisión sexual, mediante un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con 360 jóvenes hombres y mujeres entre 16 y 24 años, estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, carrera de Licenciatura en Enfermería. Para la acumulación de datos se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas asociando el conocimiento y riesgo sobre las infecciones de transmisión sexual. De los participantes predominaron aquellos entre 18 y 24 años, solteros que cursaban los niveles de primero a sexto semestre universitario. En relación con el conocimiento predominó el nivel alto. Además, se observó que la falta de percepción de riesgo predomina en estos estudiantes. No usan el preservativo, aunque teóricamente reconocen su importancia. Se identificó la necesidad de reforzar conocimientos para una percepción de riesgo alto creando así una concientización de los estudiantes para que mantengan una adecuada salud sexual y por lo consiguiente reproductiva.

**Palabras clave:** ITS, anticonceptivo, uso de preservativos.

#### ABSTRACT

The level of perception of condom use and its relationship with protection against sexually transmitted diseases was determined through a quantitative, descriptive, cross-sectional study with 360 young men and women between 16 and 24 years of age, students of the Technical University of Babahoyo, Faculty of Health Sciences, Bachelor's Degree in Nursing. For data collection, a questionnaire of open-ended questions was used, associating knowledge and risk of sexually transmitted infections. The participants were predominantly between 18 and 24 years old, single, and studying from the first to the sixth semester of university. In relation to knowledge, a high level of knowledge predominated. In addition, it was observed that the lack of risk perception predominates in these students. They do not use condoms, although theoretically they recognize their importance. The need to reinforce knowledge for a high risk perception was identified, thus creating awareness among students to maintain adequate sexual and therefore reproductive health.

## INTRODUCCIÓN

Las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) aumentan en el mundo, afectando a la humanidad de diferentes edades, sexo, raza y estatus social. La Organización Mundial de La Salud (OMS) refiere que en el mundo existen más o menos 340 millones de nuevos casos curables, entre personas de 15 y 49 años. (Martínez & Angélica, 2009; De Munain, 2020).

El Estado Ecuatoriano es un Estado de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, laico, multiétnico y pluricultural; que garantiza el derecho a la salud como un derecho fundamental, vinculado al ejercicio de otros derechos, que sustentan el buen vivir.

La educación sexual constituye uno de los problemas de salud más importante en prevención comunitaria, tanto así que en los países desarrollados de América latina; es común las relaciones sexuales sin protección a corta edad, proporcionando un posible aumento en de ITS a los individuos. Por ello la OMS realiza varias campañas, promoviendo la utilización de métodos de barrera, con la finalidad de proteger a las personas no solo de una ITS si no prevenir embarazos no deseados. (Franco-Girardo et al. 2008; Soriano-Ayala et al. 2014)

El enfoque de sexualidad integral plantea la necesidad de pensar la sexualidad, no desde una perspectiva meramente reproductiva, sino reconocerla como parte del desarrollo integral del ser humano durante las diferentes etapas de su vida, en la que es fundamental la autonomía para decidir sobre la vida sexual sin violencia y discriminación (Broche et al. 2009).

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública-MSP realizó una campaña llamada Habla Serio Sexualidad sin Misterio (Ecuador. Ministerio de Salud Pública, 2017; Trejo et al. 2015), con el objetivo de dar a conocer a los adolescentes sobre la sexualidad, de una forma veraz y correcta, la cual fue impartida a través de unidades educativas, promoviendo no solo el uso de métodos anticonceptivos; sino también crear una percepción de lo que es tener relaciones sexuales con otra persona. La campaña se extendió por todo Ecuador, además se implementó dispensadores de condones en las entidades de salud, para que las personas sexualmente activas adquieran su preservativo. Debido a eso se disminuyó la tasa de ITS y de embarazos.

De esta manera en la provincia de Los Ríos, dan cobertura de información a los adolescentes a través de la página web de Ministerio de Salud Pública-MSP, también implementación a las unidades educativas información y campañas; a nivel local en la actualidad tenemos una población informada sobre todos los riesgos posibles de un acto sexual,

pero se constató que el problema parte desde la comodidad del ser humano a nivel sexual, otros los definen amor, otros simplemente no ponen en prácticas sus conocimientos y en casos escasos, pero existentes motivo religioso; todo esto encierra el problema de la sociedad.

Esta investigación, se realizó con el fin de detectar el nivel de conocimiento de educación sexual y de qué manera ponen en prácticas sus conocimientos, no sólo los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, sino la población fluminense.

## MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo y prospectivo en la Carrera de Enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud en la Universidad Técnica de Babahoyo, provincia Los Ríos en el segundo semestre 2019, con el objetivo de determinar. La Percepción del uso de preservativos y su relación con la protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Considerando sus intereses, necesidades, objetivos comunes, sus interacciones y su capacidad política de influir sobre las decisiones.

Con utilizaciones de varias técnicas de investigación, para el diagnóstico se ha emprendido detectar las principales causas, dificultades, condiciones y limitaciones tanto del grupo como del entorno fluminense. Con el objetivo de observar la fluidez de desenvolvimientos de la relación entre los adolescentes con sus conocimientos, sentimientos, y sus expresiones; para así relacionar el contexto con la hipótesis existente respecto a la educación sexual primaria.

El universo estuvo constituido por la totalidad de los estudiantes de los distintos semestres que están en edad fértil o con probabilidades de contraer una infección de transmisión sexual. Para conocer la percepción de riesgo en los estudiantes de los distintos semestres de la Carrera de Enfermería, se realizó una encuesta, tomando un muestreo no probabilístico, intencional de selección sucesiva, previo consentimiento de los mismos.

Para la recopilación de la información se utilizó un instrumento de carácter social, para obtener variables como edad y sexo. Para evaluar el nivel de conocimiento en los jóvenes universitarios se construyó un instrumento de 20 preguntas.

Entre las preguntas evalúan el conocimiento, con respuestas de elección múltiples y abiertas relacionadas con métodos de protección contra ITS, edad de su primera actividad sexual, número de parejas sexuales y donde adquirió conocimientos sobre el tema. Las preguntas 6 y 9 evalúan el comportamiento del joven ante una relación sexual en pareja estable.

En relación con la información detectada en el diagnóstico, fundamentos teóricos, entorno visualizado a la sexualidad, adolescencia y comunicación en la salud; obteniendo resultados que fueron plasmados e interpretados en tablas y gráficos para un mejor análisis. Con una confiabilidad del 95% y con un margen de error del 0,05, sobre los cuales nos dieron a notar que su conocimiento es alto, ya que es uno de los saberes impartidos básicamente por el área de Salud en que nos encontramos, pero no lo suficientemente. Vale mencionar que este tipo de problema social no ha sido reciente, porque tiene años de existencia y aunque se haya realizado, propuestas, campañas, programas, la estadística demostrada en los diversos estudios se demuestra que los índices no han disminuido. Pero se cree necesarios roles de comunicación interpersonales en esencial el entorno más cercano a los adolescentes para impartir a profundidad estos conocimientos son las instituciones educativas, amistades e incluso la familia los cuales son los entornos más cercanos a los jóvenes, donde existe constante intercambio de ideas, sentimientos, y accionares que buscan identificar la realidad del vínculo entre uno a otros para enriquecer el vivir y el convivir.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN




Figura 1. Grupos etarios

De los 360 participantes predominaron las edades entre 18 y 24 años, solteros. Además, tenemos una mayor cantidad de mujeres que hombres, siendo un factor predominante; y de impacto en relación de la Carrera de Enfermería




Figura 2. Clasificación de los anticonceptivos más usados

Existe cada vez mayor evidencia acerca de que lo que suceda en los años de formación de la adolescencia será decisivo durante el resto de la juventud, y tendrá gran influencia en la salud y desarrollo futuro en lo personal, lo económico y lo social. Entre las medidas que se proponen a adolescentes para prevenir las infecciones de transmisión sexual y embarazos se resalta el uso del preservativo o condón.

Diversas investigaciones han mostrado los grados de protección que otorga el condón para cada una de las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Referente a su uso en la primera relación sexual entre adolescentes solteros muestra grandes diferencias entre los dos sexos. Mientras que uno de cada dos hombres sexualmente activos dijo haberlo usado en la primera relación sexual, sólo una de cada cinco mujeres reportó su uso. También aseguran que los preservativos son los métodos más seguros tanto para evitar un embarazo, como para evitar infecciones de transmisión sexual; seguida a este tenemos las pastillas anticonceptivas con un alto índice de consumo.




Figura 3. Las personas universitarias son más conservadas en la actualidad

En relación con la proporción de adolescentes y jóvenes sexualmente activos, se constató que la mayoría nuestros compañeros, alrededor del 99%. Conoce lo que son los preservativos muy cercanamente y el número restante tienen el conocimiento básico, pero no los han utilizado, ya que en su repertorio aseguraban que no son activos sexualmente.

Los porcentajes del total de adolescentes sexualmente activos muestran que casi no hay diferencia entre hombres y mujeres, La actividad sexual presenta una tendencia ascendente con la edad: desde casi sin actividad a los 12 años. Según el estudio se puede determinar que la edad promedio de la primera relación de los sexualmente activos fue muy similar para hombres y mujeres, tanto de manera general como si consideramos sólo a los solteros. La edad se estimó en 14 años para los hombres y para las mujeres, considerando todos los estados civiles, y en 15 años. Enfocándonos en la vida sexual de un estudiante,

podemos darnos cuenta en el momento de analizar nuestros datos; que la actividad sexual no se inicia a una edad adecuada, donde se tiene la total responsabilidad de nuestros actos. Además, podemos aseverar que son mínimos los estudiantes que aún se conservan para la pareja ideal en lo posterior.




Figura 4. Uso del preservativo con la pareja

Muchas de las respuestas en el uso del preservativo con su pareja fueron negativas, asegurando estos que si tienen una pareja fija no le ven la razón del uso del mismo. Otros tienen más criterio estructurado fisiológicamente, ya que lo utilizan exclusivamente en etapas de fertilidad. Además, una gran mayoría evita el uso de este, porque constatan que la sensación de placer no es el mismo que por ende provoca incomodidad.

Aunque se establece moralmente que una persona solo tenga una pareja sexual sea esta por mucho o corto tiempo, la promiscuidad sigue siendo un factor muy notable, aunque en la actualidad según encuestas está en un bajo índice. Ya que se está haciendo lo posible para que cada uno retome los valores abandonados por la sociedad en que vivimos.

Durante la adolescencia y la adultez temprana se observan cambios de conductas tanto emocionales como psicológicas, estableciendo aptitudes que ponen en riesgo la salud como son estas las ITS, agravando la falta de percepción de riesgo, excluyendo los conocimientos captados, dados por Ministerio de Salud Pública y otras entidades.

El predominio de los encuestados oscila con la edad entre 18 y 24 años, es decir en el periodo conocido como adultez temprana; se observó que el nivel de conocimiento prevalente en los datos fue bueno; un estudio en Venezuela con 36 estudiantes con el objetivo de determinar y modificar el nivel cognoscitivo sobre las ITS evidenció que 66.6% no tenían información sobre el tema; otra investigación con 149 adolescentes apuntó que el 45% tenían conocimiento deficiente, resultados discrepantes se presentaron en un estudio cubano donde el 66.6% de los participantes presentaron un buen conocimiento sobre el tema, además que el 64% conocían como prevenirlas.

## CONCLUSIONES

El porcentaje de adolescentes sexualmente activos varía en distintas regiones del mundo. América Latina se caracteriza por un inicio sexual en edades más tempranas que otras regiones en desarrollo como Asia, pero mucho más tardío que África.

En nuestra investigación se evidenció en nuestra población encuestada de La Universidad Técnica de Babahoyo no tienen percepción de riesgo con respecto al uso de los métodos anticonceptivos en especial de preservativo que es un método de barrera para evitar las ITS y el embarazo. Además, se arriesgan a obtener enfermedades de ITS al no utilizarlos con sus parejas estables por incomodidad.

Nuestro análisis muestra que iniciar la vida sexual a una mayor edad incrementa el uso del condón de manera sustancial; pero aun así 8 de cada 10 hombres y mujeres prefieren no utilizarlo. Y esto significa que quienes la inician muy jóvenes tienen menor probabilidad de usar preservativos en su primera relación, y, por tanto, un riesgo mayor de contraer una ITS o un embarazo no deseado.

Anticonceptivos son muy pocos en especial la población de primero a segundo semestre; por un déficit de educación en sus hogares debido a que sus familias no los orientan sobre como tener sexo seguro y responsable (Peláez, 2011). Por ellos otras investigaciones se han dirigido esencialmente la atención entre conocimiento y práctica, sugiriendo que existen algunos obstáculos culturales, religiosos entre otros, que impiden aplicar los saberes recibidos.

De esta manera podemos decir que en nuestra facultad a pesar de las charlas educativas que se imparten para el uso de métodos anticonceptivos los estudiantes no hacen conciencia de prevenir las ITS utilizando preservativo en sus relaciones sexuales incluido con su pareja estable que sería una demostración de amor y respeto para la misma.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Broche Morera, R. A., Martín Ross, D. M., Soler Porro, A. B., & Alonso Luis, Z. (2009). Comportamiento sexual riesgoso en adolescentes y sus actitudes hacia individuos con VIH en la Parroquia 23 de Enero, Caracas, Venezuela. *Humanidades Médicas*, 9(1), 0-0.
- De Munain, J. L. (2020). El desafío de las infecciones de transmisión sexual en el siglo xxi: el tratamiento es la prevención. *Medicina clínica*, 154(6), 218-220.

- Ecuador. Ministerio de Salud Pública. (2017). Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Viceministerio de Gobernanza de la Salud Pública. <https://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PLAN%20NACIONAL%20DE%20SS%20Y%20SR%202017-2021.pdf>
- Franco-Giraldo, Á., & Álvarez-Dardet, C. (2008). Derechos humanos, una oportunidad para las políticas públicas en salud. *Gaceta Sanitaria*, 22, 280-286.
- Martínez, T., & Angélica, M. (2009). Diagnóstico microbiológico de las infecciones de transmisión sexual (ITS): Parte 1. ITS no virales. *Revista chilena de infectología*, 26(6), 529-539.
- Peláez Mendoza, J. O. (2011). Importancia del conocimiento y promoción de la anticoncepción de emergencia. *Revista cubana de Obstetricia y Ginecología*, 37(3), 399-408.
- Soriano-Ayala, E., González-Jiménez, A. J., & Soriano-Ferrer, M. (2014). Educación para la salud sexual. Del enamoramiento al aborto: Un estudio cualitativo con adolescentes españoles e inmigrantes. *Perfiles educativos*, 36(144), 105-119.
- Trejo, C. A., Chimbo, K. M. O., & Coello, T. C. (2015). Los paradigmas sociales en el embarazo de los adolescentes amparados en el buen vivir y sus impactos a las tasas de mortalidad (Ecuador). *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 27(3). 1-6.